

**ISTRUZIONI
SULLA
FABBRICAZIONE
DELL'ORICELLO,
DEL CUDBEAR E...**

Giovanni Lorenzo Cantù



ISTRUZIONI

DELLA FARMACIA

DELL' ORICELLO, DEL CUDICAR, E DEL TORNASOLE

PRINCIPALMENTE COLL' UO

DEI LICHENI NOSTRALI.

Egli è da qualche tempo che gli armenieri vengono in Piemonte a raccogliere un lichene (1), che trovasi assai abbondante sulle rocce delle nostre montagne. Il Governo di S. M. essendo stato informato, m'incaricò di sottomettere tale sostanza a tutti quei saggi chimici ch'erano necessari per conoscere l'intima natura, onde stabilire gli usi ai quali si potrebbe applicare nell'interesse della nostra industria e del nostro commercio. Dell'analisi chimica che ne feci, da varie sperienze che ho instituite sulla preparazione dell'oricello, del cudicar, e del tornasole in paesi coll'impiego della medesima sostanza; e finalmente da alcune prove di tintura in seta ed in lana, che

(1) *Faciolaria lizans* di Ponceau.

ho fatto con queste materie coloranti, e principalmente da varie altre, che il sig. *Francesco Mayne*, persona di distintissimo merito nell'arte tintoria, ebbe la gentilezza d' eseguire nel suo laboratorio, mi è risultato: 1.^o che il detto lichen conteneva, fra gli altri suoi principi, l'orcinio, che è il materiale immediato che si trova nella *Parietaria oreina* (1), di cui si fa uso in Francia per preparare le dette materie coloranti; 2.^o che col medesimo si può fabbricare, con metodo facile ed economico, queste materie tintorie, le quali, tanto per apparenza quanto per facilità tingente, non sono inferiori a quelle che ora si sono provvedute dalle manifatture straniere. Da questi felici risultamenti, che già ebbero l'onore di comunicare al Ministero dell'Interno, ed alla R. Accademia delle Scienze, sono pienamente fatto consista che si potrebbe utilizzare questo prodotto naturale indigeno per fabbricare l'orcinio di terra, il cofticar, ed il giornale in papi, al qual uso viene sicuramente applicato dagli stranieri, i quali poi ce lo rivendono in tale guisa elaborato a non così tenue

(1) La *Parietaria oreina* (e non *orelia*) corrisponde alla varietà 4 della *Parietaria caudata* d'*Acharius*. Pare che il nome specifico *oreina*, adoperato dagli autori francesi per indicare questa varietà, in luogo del nome originale *orelia*, sia derivato da un errore tipografico momentaneamente ripetuto da altri autori.

pezzo. Credo perciò non inutile di presentare al Pubblico una breve istruzione su questo bel ramo d'industria chimica per servir di norma a chi volesse intraprenderne la coltivazione.

Giova frattanto avvertire che in Piemonte, come in Sardegna, oltre al predetto lichene, altri se ne trovano, sia fogliacei come crostacei, i quali sono pur anche propri alla produzione delle nominate materie coloranti, siccome ho potuto assicurarmi per via di molte indagini chimiche dirette a tale scopo; la qual circostanza vieppiù dimostra che quest'industria potrebbe prosperare negli Stati di S. M. con profitto delle nostre arti e con vantaggio del Pubblico, specialmente degl'industri abitanti delle montagne, i quali essendo a quest'ora già capaci a distinguere ed a raccogliere i principali licheni, propri alla produzione delle predette materie tinorie, troverebbero nello smercio del medesimo un sufficiente guadagno. Nell'interesse di quest'industria sto tuttora facendo altre ricerche su vari licheni nostrali, di cui mi farò cortesi i chiarissimi signori cavalieri Carera, e Moris, e dottore Denotaris, e mi farò premura di far conoscere i risultamenti che n'avrò ottenuti, quando l'utilità di questi mi sembrerà abbastanza confermata.

*Sull'oriceſſo, ſul caſſear, e ſul ſernacolo
in poſi.*

L'oriceſſo, volgarmente detto oriceſſa, or-
riceſſa dai Fraſconi, è una materia colorante,
di cui ſi fa uſo nell'arte tintoria per ottenere
vari colori, come il violetto, il porpora, l'a-
maranto e ſimili, tanto ſopra la lana, quanto
ſopra la ſeta; e ſ'adopera anſiandio con molto
vantaggio nel tingere le ſtelle in azzurro per
mezzo dell'indaco, sì per riſparmiare la quan-
tità di aſſo, che per avvivare il colore.

La ſcoperta dell'oriceſſa non è il frutto di
serie indagini chimiche, ma è bensì dovuta al
ſolo caſo, come ne fu dell'azzurro di Berlino,
che Diebach ſcoprì fortuitamente mentre cer-
cava tutt'altra coſa. Egli è un mercante fio-
rentino dell'antica famiglia de' Roccella, il quale
fu il primo ad avverare, che il *Lichen roccella*
di Linneo trovandoſi per incidente a macerare
nell'orina umana, volgeva al color turchino. Da
queſto ſenſimento curioſo ed inaspettato egli venne
ſpinto a tentar varie altre ſperienze, merco le
quali rimasì finalmente ad ottenere l'oriceſſa e
ad applicarlo con ſuccello alla tintura (1).

(1) *Circa annum 1800, mercator Florentinus cum Lichem
rocellae urinae macerante observavit, unctique in urina*

I drogghieri, come i tintori, distinguono due sorta d'oricello. La prima è designata col nomi d'*oriccillo d'erba*, *oriccillo delle Canarie*, *oriccillo di mare*. Questa si prepara generalmente col lichene *coccella*, e talvolta pur anche col *Lichen sartorius* di Linceo, volgarmente detto *musco di Spagna*. La seconda è chiamata col nomi d'*oriccillo di terra*, *oriccillo d'Alvergna*, *oriccillo di Liore*, e si prepara per lo più colla *Parietaria creta d'Achatis*, detta volgarmente *parelle dei Francesi*, e probabilmente anche con altri licheni crostacei di natura analoga, designati collo stesso nome volgare dai raccoglitori, come sarebbe, ad esempio, la *Parietaria lactea* di Persoon.

L'*oriccillo d'erba*, o di mare, è il più pregiato dai tintori, sia perchè possiede maggior facoltà tingente, sia perchè il suo colore è più elegante di quello che somministra l'*oriccillo di terra*; ed è appunto per cotali pregi che la prima di queste materie coloranti si soudeava costantemente a .pezzo maggiore, che non quest'ultima.

L'*oriccillo* si trova in commercio sotto forma

testaminibus tandem hoc tempore dicitur, quod illi magis comparati dicuntur, et Florantibus adhuc jam profuturum, ut non possint bene Raccollis conservari (Bernardus, Clavis phy: et chem:)

di pasta più o meno molle, di color rosso violaceo più o meno intenso.

Il *cudbear*, nome desunto da Cudbert Gordon che ne fu l'inventore, non differisce, come vedremo, essenzialmente dall'oriceUo. La sola differenza sta in questo, che il *cudbear* è allo stato secco e polveroso, mentre l'oriceUo è sotto forma molle pastosa. Laonde, rigorosamente parlando, si può dire che il *cudbear* è oriceUo secco; difatto queste due sostanze sono adoperate a vicenda dai tintori per le medesime lavari. Egli è pure molto probabile, e come s'ieno che la materia colorante, la quale si vende in commercio sotto il nome d'oriceUo di terra depurata, o d'oriceUo violetto, altro non sia che una varietà di *cudbear*, o d'oriceUo secco (1).

Il *rosmarolo in pani*, detto anche *lacca maffa*, *rosmarol en pains* dai Francesi, è una sostanza di color turchino, che si usa principalmente nelle fabbriche di carta dipinta, e si adopera esandio nei laboratori chimici per svelare la presenza degli acidi liberi. Per lungo tempo

(1) In Germania si fabbrica una materia colorante analoga all'oriceUo ed al *cudbear* colPuso del bitume tartaro di Lione, e coll'ajuto della calce e dell'oriceUo, alla quale si dà il nome di *porale*; ma questa non vuol essere confusa con altra materia tintoria di color analogo, preparata con legami di bruciato polverizzato, ed oriceUo essicato, che, secondo Heraboldt, si vende sotto tutto lo stesso nome.

si era creduto che questa sostanza si preparasse esclusivamente coll'uso del *Croton tinctorium*, pianta appartenente alla famiglia delle euforbiacee di Jussieu, ed alla monocotila monodelphia del sistema sessuale di Linneo. Il sempre celebre Chaptal avendo riconosciuto per via dell'analisi chimica, che la materia colorante del tornasole aveva la massima analogia con quella dell'orricello, ed essendo inoltre riuscito a preparare tale sostanza colle stesse lichene (*Parietaria oreina d'Acharius*) di cui si fa uso in Francia per fabbricare l'orricello, si può dire con ragione ch'egli è stato il primo a dissipare quell'antico errore, e ad introdurre in Francia questo ramo d'industria chimica, che gli Olandesi coltivavano già da lungo tempo con molto vantaggio all'ombra del mistero.

I licheni, i quali sono proprii alla preparazione dell'orricello, servono pur dessi a preparare il tornasole; e la pratica come la teoria della fabbricazione dell'una e dell'altra sostanza sono fondate sui medesimi principii, essicchè può dirsi con ragione essere una stessa industria. Quindi è che nelle manifatture, in cui si fabbrica l'orricello, sovente si prepara anziutto il tornasole.

Nelle fabbriche dell'Olanda, per preparare queste materie coloranti, si fa uso generalmente del lichene raccolta nelle Casarie, o del Capo-

verde, ed anche del lichén tartaro di Linnæo, volgarmente detto musco di Svezia, coi quali s'ottengono prodotti di superiore qualità, sia per apparenza che per facoltà colorante; in quelle di Francia s'impiega particolarmente la *Parietaria* ora ora soprannominata, e verosimilmente anche altri licheni di natura analoga, siccome abbiamo già avvertito parlando dell'orizello di terra, detto anche orizello d'*Alvergna*, o di *Lione*; da questi licheni si ottengono bensì eccellenti prodotti, ma però sensibilmente inferiori ai primi.

In mezzo a tanta luce di scienza chimica, ed ai tanti progressi dell'industria, sembra impossibile che nelle fabbriche dell'orizello, come del cudbear e del tornasole, si faccia ancor oggi qualche mistero e del metodo operativo, o delle sostanze che soglionsi associare ai licheni per preparare la detta materia tintoria. Tuttavia nello stato attuale della scienza si può dire con fondamento che questa industria è affatto svelata, e che perciò non è più un segreto. Diffatti chiunque sia mediocrementemente istruito dei primi elementi della scienza chimica, potrà facilmente farsi un'idea corretta esaminando con attenzione i vari metodi di preparazione qui appresso descritti.

*Preparazione dell'oriceolo secondo
il metodo fiorentino.*

Questo metodo, pubblicato da Micheli, consiste nel prendere il lichen roccella di Linneo, volgarmente detto roccella, ed orcella, separato, per quanto è possibile, dalle materie eterogenee; lo si fa seccare, e quindi si riduce in polvere sottile, e poscia si mette in una tinoccia di legno, la quale s'allarghi un tantino verso la sua parte superiore, ed abbia una capacità tripla di quella che si richiede per lo lichene da introdursi; vi si aggiunge della sabbia del commercio polverizzata nella proporzione d'una dodicesima parte in peso dello stesso lichene; allora vi si versa sopra dell'ecina umana pressata a corresponsi, rivolgendo ben bene il mescoliglio con un ramiscolo di legno, ed aggiungendo quanto basta dello stesso liquido animale, finchè ne risulti una pasta molle ed uniforme. Ciò fatto, si copre la tinoccia col suo coperchio, e si lascia la materia in riposo per alcune ore; indi la si rivolge di nuovo ben bene, e tanto si riepoca il recipiente col suo coperchio. Questa operazione vuol essere ripetuta ogni due o tre ore, ed anche più sovente, se la quantità di materia su cui si opera, è molto ragguardevole, e se la temperatura dell'ambiente è molto ele-

vata, come nei forti calori dell'estate; e così debbesi continuare ad agire, finchè la materia abbia acquistato un colore rosso-violaceo molto intenso, avvertendo però che in quel frattempo si deve sempre molliccare la pasta con nuova orina a misura che questo liquido si evapora.

A tal punto la preparazione dell'oricello è terminata. Epperò si estrae dalla tinnea, e s'introduce in una botte, e si ricopre d'uno strato d'orina recente, che si rinnova allorchando per l'accaduta evaporazione di questo liquido la superficie della pasta si trova quasi a secco. Oltre a ciò è necessario di chiudere la botte con adattato coperchio.

Più tardi questo metodo è stato modificato con aggiungere alla prodotta sostanza una certa dose di salnitro, di sal gemma o sal marino, di sal ammoniaco, e d'arsenico bianco, ossia acido arsenioso. Ma Hellyet, avendo riconosciuto con proprie sperienze che tale addizione era inutile, propose e riuscì di fatto ad ottenere l'oricello col mestoso lichene, e col solo aiuto dell'orina putrida e della calore estiva.

Preparazione dell'oricello, secondo il metodo che si pratica a Clermont nell'Auvergne.

In questo paese per preparare l'oricello si fa uso ordinariamente della *Parietaria oreline*, ed

anche d'altri licheni crostacei, in vece del lichen coccella e del lichen tartaro, e musco di Svezia, siccome già abbiamo avvertito.

A tal fine si prendono cento parti in peso di lichene ben seccato dalle materie eterogenee e ridotto in sottil polvere; si mette in una cassa di legno di due metri di lunghezza sopra $0^m, 6$ e $0^m, 7$ di profondità, e $0^m, 4$ di larghezza al fondo, la quale s'allarghi un poco verso la parte superiore; vi si versa sopra dell'orina a poco a poco, ben rivolgendolo il miscuglio con una spada di legno, e se ne forma una pasta ben molle; indi si chiude il recipiente con un coperchio di legno ben adattato; si lascia la materia in riposo per alcune ore, poscia si rivolge di nuovo, e si continua ad operare in simil guisa per due giorni e due notti ad intervalli non maggiori di tre ore. Nel terzo giorno di reazione s'aggiungono cinque parti di calce estinta e passata per setaccio di orina; un quarto d'acido arsenioso o arsenico bianco del commercio, ed un quarto d'allume di rocca, ridotti in fina polvere, e vi si versa sopra un po' d'orina per impedire che s'innalzi il polviglio arsenicale nell'aria che si deve rivolgere la pasta dell'orcello per frammiscolarvi esattamente queste diverse sostanze; il qual affetto potrebbe nuocere moltissimo a chi deve eseguire questo lavoro.

Ciò fatto, si lascia il miscuglio in riposo per alcune ore, indi si rivolge nuovamente la materia, il che si ripete ogni ora, affinché non si formi una crosta di acetocarbonato di calce, la quale impedirebbe in gran parte l'influenza dell'aria atmosferica, che è necessaria alla produzione della materia colorante. Al termine di 48 ore il movimento fermentativo si rallenta, ed allora s'aggiunge una parte proporzionale di calce estinta, e si continua a rivolgere il miscuglio, come sopra, quasi per un eguale spazio di tempo. Quando poi s'osserverà diminuire l'attività della reazione, si potrà andar più a rilente nel rivolgere la materia. Al qual riguardo giova tenerla notare, che la regola generale da seguirsi è la seguente:

Nel quinto giorno si deve rivolgere la materia ad intervalli di due ore; nel sesto di tre; nel settimo di quattro, e nell'ottavo basta ciò eseguire ad intervalli di sei ore, e si prosegue in tal modo ancora per 24 giorni consecutivi, o meglio ancora finché la pasta abbia acquistato un bel colore rosso-violaceo intenso; il qual effetto s'ottenne generalmente nello spazio di 30 e 40 giorni. Allora s'introduce l'orciuolo in tinozze di legno, e si bagna con acqua e recate orina per impedire l'essiccamento. Con tale precauzione si può conservare questa materia colorante per circa due

anni, se dove si riponga in botti munite d'adatto copercchio, e queste siano tenute in un magazzino sufficientemente secco e fresco.

Preparazione dell'oriscello senza l'uso dell'ortica.

Chiunque non affatto digiuno di scienza chimica si faccia ad esaminare gli effetti che produce l'ortica sui licheni nella preparazione dell'oriscello, facilmente si persuade, che l'utilità di questo liquido animale si riduce a favorire la reazione chimica per mezzo dell'acqua che contiene, ed a somministrare dell'ammoniaca nell'atto della sua purificazione. Egli è perciò che Corq e Robiquet, stangharono già da lungo tempo di adoperare l'ammoniaca allungata nell'acqua a vece dell'ortica; il qual nuovo metodo è più comodo, e fors' anche più economico di quel che non sia quello per mezzo dell'ortica, l'ossimamente al giorno d'oggi, in cui si trova facilmente l'ammoniaca in commercio a moderato prezzo (1).

Già posto, e gli esperimenti dell'analisi chimica della varicella latente vettale, che danno sì di natura quasi identica colla varicella ocina,

(1) È molto probabile che questo metodo sia ora quasi universalmente adottato nelle officine di Parigi e di Lione.

di cui si fa uso in Francia per la fabbricazione dell'orciello, ed avendo inoltre ottenuto questa materia colorante di bontà pari a quella che ci viene da questo paese, coll'impiego del nostro lichene, sia per mezzo del metodo fiorentino, che per mezzo di quello di Clermont sopradescritti, non mi fu difficile di prevedere, che sarei felicemente riuscito ad ottenere uguale successo, valendomi dell'ammoniaca allungata nell'acqua in vece dell'orice. A tal fine ho istituite varie prove preliminari dirette ad assicurare il risaltamento d'un prodotto di costante bontà, ed a conciliare nel tempo stesso la necessaria economia; al che mi sembra d'essermi pervenuto col procedere nella seguente maniera:

Si prendano 100 parti di varioliera latta nostrale sordida polverizzata; ammoniacale liquida di commercio concentrata, parti 20; 130 parti d'acqua comune della miglior qualità possibile. Si mette la varioliera in una stinca di legno, munita di ben adunato coperchio, la cui capacità sia doppia almeno di quella che si richiede per contenere tutte le sopra indicate materie, e sia fatta in guisa che s'allarghi un poco verso la sua sommità, quasi a forma di campana, vi si versa a poco a poco l'ammoniaca, preventivamente allungata nella dose d'acqua sopra stabilita, e rivolgendo continuamente il

mescolglio con una spatola di legno si forma una pasta uniforme, avendo l'avvertenza d'aggiungervi un po' d'acqua, qualora la dose di liquido sopra determinata non bastasse a formare una pasta ben molle, a guisa di poltiglia; indi si chiude esattamente la tinotta col suo coperchio, e s'abbandona la materia al riposo per alcune ore, poscia si rivolge di nuovo ben bene, e vi si pone tanto il coperchio come prima. Questa operazione si debbe ripetere almeno sei volte nelle 24 ore ad intervalli eguali, quando la quantità di materia, su cui si opera, non è molto ragguardevole, e la temperatura dell'ambiente non è molto elevata; ma con maggior frequenza nel caso contrario; e così proseguirsi ad agire, finchè la materia abbia acquistato un bel colore rosso-violaceo intenso. A questo punto si va un po' più a rilento a rivolgere il mescolglio, per evitare il disperdimento del gas infiammabile che si trova frammisto all'aria nella parte vuota della tinotta; ma però si continua a rimuovere la materia finchè dessa abbia acquistato un bel colore rosso-violaceo carico, il qual effetto s'ottiene ordinariamente nello spazio di 40 a 50 giorni; allora la preparazione dell'orecchio è terminata, ed altro non rimane a farsi, che introdurre questa sostanza in tinotta di legno munita d'adattato coperchio, che si tengono

in un magazzino sufficientemente fresco, avendo però l'avvertenza di malficare la pasta con poca acqua, quando la medesima è prossima ad asciugarsi.

Il tempo che generalmente è necessario per convertire il nostro lichene in oricello è, come abbiamo detto, di 40 a 50 giorni. Ma egli è però da dire, che la ricchezza e l'eleganza del suo color aumentano ancora notabilmente durante lo spazio d'un anno e più, per mezzo della successiva lentissima reazione, che ha luogo, quando questa sostanza trovasi rinchiusa nei recipienti per conservarla. Ma però conviene osservare, che dopo tale spazio di tempo questa materia comincia perdere del suo merito tintorio, e finisce coll'andar del tempo per decomporci lentamente; i quali effetti avvengono estendo nell'oricello preparato con altri licheni e coll'uso dell'orina.

Del cudbear e della sua preparazione.

Il cudbear, come già dicemmo, altro non è in sostanza che l'oricello secco. Difatti, se lo si faccia seccare coll'aiuto di moderato calore e col fervore dell'aria, e quindi si riduca in polvere, s'ottiene una sostanza di color rosso-violaceo, più o men carico, la quale ha tutte le

proprietà tintoria essenziali del cudbear che trovansi in commercio. Tuttavia giova notare che, trattandosi d'aver questa sostanza per tenerla in commercio, non mai si deve far uso dell'orricello preparato coll'uso dell'aceto, poichè trovandosi in questo liquido animale delle materie deliquescenti, il cudbear, che s'ottierebbe in tal caso, attraendo l'umidità dell'aria, ne sarebbe ammollito, e diventerebbe quasi pastoso, la qual condizione, comunque non sia gran fatto influente sulle sue qualità tintorie, ne renderebbe tuttavia difficile la vendita, perchè tali non sono le apparenze di quello che si trova in commercio. È appunto per tali ragioni che per preparare questa sostanza si adopera l'ammoniaca e non l'aceto. Premesse queste osservazioni, ognuno comprende, che si può agevolmente ottenere il cudbear per mezzo dell'orricello ottenuto dal nostro, come da altri licheni, col sopradescritto metodo. A tal fine si prende la pasta dello stesso orricello, e tanto meglio se questa avrà di già alcuni mesi, ed anche un anno di data; si mette in larghi piatti di terra verniciata, oppure in cassette di legno quadrilunghe, di poca profondità, che si collocano sopra tavole a ciò disposte in un granaio poco illuminato e ben aereato, e lì si tengono finchè la pasta sia ridotta a secchezza. Questo effetto si ottiene fa-

difficile in estate senza calor artificiale, ma è necessario di ricorrere a questo aiuto in inverno, avvertendo però che questo debb' essere moderato. Allorquando la materia sia ben secca, s'estrae dai recipienti, e si riduce in polvere in un mortaio, e per mezzo di un macinatoolo messo in azione dall'acqua, secondo le particolari convenienze del fabbricatore; la polvere ottenuta si passa per un fino setaccio di orino; le parti grossolane superstiti si ripetono, e si risoccano al macinatoolo, e quindi si stacciano; allora si mescola esattamente questa polvere colla prima, e si conserva in recipienti di legno internamente rivestiti di carta in un magazzino fresco e secco.

*Del tornasole in pezzi, o lacca maffa,
e della sua preparazione.*

Il tornasole, o lacca maffa, come già si è detto, è una materia colorante turchina, che ha molta analogia coll' oricello.

Gli Olandesi sogliono preparare il tornasole mescolando i lichzi ridotti in polvere ad una metà del loro peso d'allume di foccia in una cassa di legno di quattro metri di lunghezza, d'uno d'altezza, e di due terzi di metro pel fondo, la quale si allarghi un poco verso la

una consistenza; vi si versa sopra a poco a poco dell'orina, e per mezzo d'una spatola di legno se ne forma una pasta molle, che si va rivestendo di quando in quando, e con maggior frequenza se la temperatura dell'ambiente è molto elevata, e se la quantità di sostanza è molto ragguardevole, aggiungendosi sempre nuova orina a misura che questa si evapora: allorchè la materia avrà acquistato un color rosso interno, si mette in un'altra recipiente simile al primo, e vi si aggiunge ancora dell'orina, e ben si mesce; in pochi giorni la materia acquista un color volgente al turchino; allora si ripartisce la materia in tizzone di legno, e vi si aggiunge un terzo di stira potassa del commercio, e sufficiente quantità d'orina per formare una pasta molle. In questa pasta si modera il movimento fermentativo, e la pasta acquista un bel color azzurro nello spazio di 50 giorni, massimamente quando si è adoperato il lichen roccella, ed il lichen tartaro. Allora vi s'incorpora esattamente della creta, o carbonato di calce in sottilissima polvere per darla alla pasta una maggior consistenza; indi si divide in piccoli pani rettangolari che si fanno seccare all'ombra in grandi boia' aerati.

Nelle manifatture francesi si segue lo stesso sistema di fabbricazione, se non che si fa uso ordinariamente della variolaria ovina in vece

del lichon recolla e del manto di Svezia, ed in vece d'aggiungere nuova dose di pozzana alla materia già diventata di colore turchino, vi si aggiunge un quarto del peso totale di calce estinta. Il tornasole, che s'ottiene per questo modo, volge un tantino al rosso; perchè si deve ripetere principalmente dalla diversità del lichone, anzichè dal metodo.

Il felice successo, che ottenni nella preparazione dell'ocello coll'uso del nostro lichone, m'ha naturalmente condotto a tentare quella del tornasole in pari. A tal fine ho cominciato a provare il metodo svedese; e quindi quella che si pratica in Francia; e sì dell'uno che dell'altro ebbi risultati abbastanza decisivi per poter dire, che il prodotto nostro lichone serve benissimo alla fabbricazione del tornasole.

Tuttavia non debbo tacere, che l'esperienza m'ha insegnato esser necessariamente importante la bontà di questa materia colorante preparata coi due predetti metodi. Il qual inconveniente si deve ripetere dalla varia potenza dell'allume di feccia del commercio, e dalla varia dose di carbonato di calce, che s'aggiunge alla pasta per darle la debita consistenza; addizione questa che, in sostanza, non può farsi senza deterioramento del merito reale di tale materia colorante. Ho perciò fatto alcune prove in pro-

pesco, dirette ad ottenere un prodotto di più costosa base. Al qual risultato mi pare d'essere pervenuto col metodo seguente:

Si prendono due parti in peso di variolera latex naturale sottilmente polverizzata; tre parti di sottomarbonato di potassa depurato, ottenute dal lavaggio della cocca ordinaria, e tre parti di calce grassa, spenta coll'acqua e passata per setaccio di crino.

Si mette il lithene ed il sottomarbonato di potassa in una tincola di legno, la quale sia capace di contenere almeno il doppio delle materie sopra indicate, ed abbia un coperchio suo a coperirla esattamente; la forma di questo recipiente debb'essere tale che si allarghi un tantino andando verso la sua sommità, cioè che sia sensibilmente campaniforme; vi si versa sopra a poco a poco dell'orina, e per mezzo di una spatola di legno si opera un perfetto miscuglio di queste sostanze, e se ne forma una pastiglia. Ciò fatto, si abbandona il miscuglio al riposo per lo spazio di cinque o sei ore; indi nuovamente si rivedge, e si ripete quest'operazione ad intervalli, di tre o quattro ore nei primi quindici giorni di reazione, ed anche un po' più frequentemente, se la quantità di materia, su cui si opera, sia molto ragguardevole, e se la temperatura dell'ambiente sia

molto elevata; allorché la materia abbia acquistato un colore rosso di porpora, vi si mescola cautamente la dose di calce estinta e passata per setaccio sopra determinata, aggiugnendosi quanto basti d'urina per formare una poltiglia uniforme, che si deve rivolgere come sopra, finchè la materia abbia acquistato un bel colore turchino, e più non presenti sensibile movimento di fermentazione; il che ha luogo ordinariamente nello spazio di 60 giorni, se la temperatura dell'ambiente si mantiene dai 15 ai 20 gradi del termometro reaumuriano. Allora si ripone la materia in cassette di legno quadrangole, e si fa seccare in un granaio poco illuminato e ben aereato. Si ha per questo modo il tornasole in forma solida, che debbesi conservare in recipienti di legno in magazzino fresco e secco.

Qualora si voglia avere il tornasole in piccoli pezzi, e faggin di quelle che trovai nel commercio, allora si prende la pasta di tornasole ridotta a maggior consistenza, e si batte in un mortaio, oppure si sottopone all'azione di un macinatoò, onde renderla più uniforme nelle sue parti integranti; poscia si stende su d'una tavola di legno ben liscia, e si riduce, per mezzo di uno spatolatoio di legno, in un foglio della spessore d'un dito circa, e quindi

si taglia con un coltello in tanti piccoli pezzi quadrangoli, che si fanno seccare, e si conservano, come sopra.

Nozioni generali relative alla teoria ed alla pratica della fabbricazione dell'oricello e del tornasole.

La materia colorante dell'oricello, come quella del tornasole, di cui abbiamo parlato, non esiste già bell'e formata nei licheni, ma sono bensì un prodotto della reazione chimica che questi vegetali hanno subito coll'acqua e colle materie alcaline sotto l'influenza dell'aria.

Ness d'Esenboeck credeva che nei licheni esistesse una materia particolare d'indole resinosa, scolorita, la quale fosse capace di acquistare il colore rosso-violaceo, allorché questi vegetabili venivano convenientemente assoggettati alla simultanea efficacia chimica degli ora mentovati agenti. Ma dopo le esperienze di Robiquet, sulla varicharia urtica d'Acharius e di Heeren, sul lichen scella e sul lichen tartaro di Linnæ, si può dire che le nostre cognizioni a questo riguardo sono ora assai più estese. Difatti egli è ben dimostrato che nel primo di questi licheni esiste un materiale immediato vegetale da tutti gli altri distinto, de-

sigillato da Balaquet col nome d'orcina, bianca, affatto solerina, il quale, posto nelle sopra mentovate circostanze di chimica reazione, si muta in una materia di color rosso-violaceo, ed in turchino, secondo che quello viene in reazione con sola ammoniaca, o poca dose di potassa e di soda, come nella preparazione dell'oracello, oppure con ammoniaca e molta quantità dei detti alcali fissi, come nella preparazione del tornasole. Egli è pure dimostrato che negli altri due nominati licheti si trova quando un materiale immediato, chiamato da Beeren col nome di *eritina*, un po' diverso dall'orcina, ma però, come questa, suscettivo di colorarsi in rosso-violaceo, ed in turchino, quando si trova nelle medesime circostanze. Posto questo caso come verità chimiche dimostrate, si può dire, che l'arte di fabbricare l'oracello ed il tornasole consiste nel far reagire convenientemente i licheti, i quali sono sufficientemente ricchi dei due principii oracelligeni, coll'acqua, coll'ammoniaca e colle altre nominate sostanze secondo sopra la contemporanea influenza dell'aria. Epperò, sia che s'adopri l'orcina unitamente alla calce, alla potassa, ed alla soda, sia che s'escluda l'orcina e vi sostituisca l'ammoniaca allungata nell'acqua con addizione delle altre materie alcaline, la

teoria del colorimento dei licheni è sempre la medesima. Nel primo caso l'ammariaca è somministrata dall'orina per mezzo della sua spontanea decomposizione e dell'azione delle altre materie alcaline, che s'aggiungono, le quali concorrono anch'esse in qualche modo allo stesso effetto; nel secondo caso l'ammariaca si trova bell'e formata, libera e semplicemente solida nell'acqua in un'colle materie alcaline cooperanti alla produzione del colore dell'orecchio, come del tornasole.

Non si deve frattanto perder di vista un altro effetto che l'idea prodotta dalle sostanze alcaline, il quale consiste nel saponificare la materia grassa, di cui ridondano i licheni, e nel render per tal modo più facilmente solubile nell'acqua il principio oricestigene nel medesimo contenuto, affinchè riceva la necessaria influenza dell'aria per colorarsi; al qual effetto concorre anzidie il movimento fermentativo che si eccita nei licheni, quando si trattano coi densi agenti per convertirli in orecchio, ed in tornasole (1).

(1) Dalle sperienze di Boilquet si può dedurre che nella reazione della varcolana orina (o uraglia orina, siccome gli alchimisti dicevano) coll'ammariaca, che ha luogo nella porzione dell'orecchio, il metallo immediato, di questo chiamato degl'antichi col nome d'orina, subisce una essenziale modifica-

Varie circostanze possono favorire la reazione dei licheni di cui si ragiona, ed influire sulla bontà delle materie tintorie che se ne ottengono.

E primieramente conviene che i licheni siano mondati, per quanto è possibile, dalle materie eterogenee, con cui si trovano ordinariamente frammisti.

2.^a È necessario che siano ridotti in sottil polvere, affinchè il dissolvente possa agevolmente penetrare l'intima sostanza per estrarne il principio colorifugo, e portarlo al contatto dell'aria.

3.^a O sia che s'impieghi l'orina, o sia che si faccia uso dell'ammoniaca liquida, allungata nell'acqua per convertire i licheni in oricella, ed in tornasole, fa d'uopo che la pasta sia costantemente ben molle. A tal fine si può aggiungere dell'orina nel primo caso, e dell'acqua nel secondo.

come nell'ultima sua natura, appropriandosi una parte dell'acido dell'ammoniaca e convertendosi in una oricella molle, che egli ha chiamata col nome di *dermas*, la quale può considerarsi come la materia colorante dell'oricella. È pur probabile che il coloramento dagli altri licheni, posti nelle medesime circostanze, sia l'effetto di una sostanza. Si vuole poi che maggior tendenza di colore che questa sostanza abbia perpendendo del tornasole in pezzi, pure la si debba ripetere della parte indurita degli stessi licheni, i quali restano evidentemente più chiari l'azione chimica dell'ammoniaca sul materiale immediato colorifugo che rispettivo lichene.

4.^a La temperatura che sembra meglio convenire per la reazione dei licheni, si è dai 15 a 25 gradi di Reaumur. Al di sotto di questi limiti la reazione va troppo a rilento, e v'ha perciò perdita di tempo: al di sopra è troppo viva, e v'è perciò distruzione parziale di materia colorante e notabile perdita d'ammoniaca.

5.^a La conversione dei licheni in oricello, od in tornasole, può effettuarsi anche con piccole quantità di materiali; ma riesce però assai meglio quando si opera sopra quantità un po' ragguardevoli. È tuttavia molto probabile che non conseguano nemmeno d'agire sopra masse troppo forti, sia perchè, eccitandosi gagliarda reazione chimica, s'incontrerebbero gl'inconvenienti ora accennati della depredazione dell'ammoniaca, e della parziale distruzione della materia colorante; sia ancora pel motivo che riesce troppo difficile il risvolgimento della materia per farla risentire l'azione colorante dell'aria.

Finalmente non è inutile d'apprendere l'influenza, che debbono esercitare alcune sostanze tuttora adottate in alcune manifatture per preparare l'oricello. Ed in primo luogo si debbe notare, che l'arsenico può solamente giovare per la sua virtù antiputrida, e che perciò è inutile ed anche nociva l'aggiunta di questa sostanza, quando non si sia la necessità di

conservare l'orricello per molti anni; 2.^a l'uso dell'allume debbe poi essere combinato, perchè vi si stempera in gran parte, perde perciò nella stessa proporzione della sua virtù astringente, e lascia inoltre precipitare l'allumina, la quale assorbe la materia colorante dell'orricello, e forma una lacca insolubile, con che ne vien diminuita la facoltà tingente; 3.^a la calce giova in quanto che stempera i sali ammoniacali dell'orina; ma per altra parte nuoce perchè forma dei sali insolubili nell'acqua, i quali assorbono essi pure una parte della materia colorante dell'orricello, formando quasi delle lacche, e ne scemano perciò la bontà; ond'è che solamente nella preparazione del veruasole si può adoperare con vantaggio la calce, poichè questa materia colorante è piuttosto adoperata come lacca anzi che come materia tintoria; 4.^a la potassa e la soda servono, come la calce, a decomporre i sali ammoniacali dell'orina, e formano sali solubili nell'acqua, e lasciano libera la materia colorante; finalmente rendono più efficace l'azione dell'ammoniaco, che è il principale agente della reazione colorante.

AVVERTIMENTI.

LXXXX

ALLA RACCOLTA DEI LICHENI NOSTRALI

*proprii alla fabbricazione dell'Oricello
e del Tarnasole in pani.*

Gli abitanti delle nostre montagne già conoscono per pratica uno dei più frequenti licheni nostrali, proprii alla fabbricazione dell'oricello, e del tarnasole in pani, cioè la *Varicolaria lutea* di Persoon (1); e molti sono pure già abbastanza

(1) *Varicolaria crassa* tenui loricibus determinata ricasae aeneola lutea sui cinerascens, apotheciorum verrucis hemisphaericis conflatis marginatis cupreomaculis effluviis pulverulentis, stroma diffusis, reticulato-diffusibus subconfluentibus. (*Ex Bot. bot. gall. pag. 674*.)

Secondo l'opinione di alcuni botanici, questa varicolaria non sarebbe in sostanza che una degenerazione del *Lichen porcinus* di Linnæo, sotto *Paraselle pediformis* d'Adanson, prodotta da cause, che nello stato attuale della scienza non è ben agevole di precisare. Io mi debbo incompie di portare finché giudico in tale questione. Ma però, appoggiato ai risultati dell'analisi

suscitati a farne la raccolta per potersi dare a questo lavoro con sufficiente guadagno, allorchando pel suo impiego nella fabbricazione delle predette materie tintorie, che si potrebbe stabilire, ed attuare nei Regi Stati, ve ne sarà facile smercio: tuttavia non credo sia inutile il dare alcuni brevi avvertimenti in proposito, onde renderne la conoscenza, e la raccolta più famigliari, sia dell'interesse della popolazione, dove questo lichene naturalmente si trova, come dell'industria chimica, a cui si può utilmente applicare.

Questo lichene nasce e vegeta spontaneamente sopra rocce d'ogni maniera, e variamente esposte; esso vi si presenta generalmente coll'aspetto d'una muffa cretacea, di colore talvolta bianco-lattesco, talvolta cinericio, più o men carico; vi si osservano a occhio nudo

chiusa compattata, poco ben assorta i botanici, che l'hanno naturo del *Lichen parvulus* in stato normale è alquanto diverso da quello della *Parietaria lichen*, di cui si ragiona.

E qui opportuno di osservare, che nelle nostre montagne si trova un altro lichene analogo, al quale ha grandissima analogia colla varietà *Lichen montana*; e porta veramente, che quello non è il *Lichen parvulus* di Lichen, come si è per lungo tempo creduto prima delle esperienze di Gœtz e di Rabenort; ma è bensì la *Parietaria cretacea* d'Adanson (volgarmente detta da Francesco Parvella d'Avignon), la quale differa i caratteri dell'analisi chimica che ne hai consequentemente, ed anche quasi di natura identica colla varietà *Lichen montana*.

multi, biforcutei, o piccole protuberanze convesse, molto ravvicinate le une alle altre, in qualche modo paragonabili alle puntate del rufule, fra le quali si vedono molte sottili fenditure; vi si scorge in oltre che la superficie si scoglie, e si sfiora in un polviglio bianco-latteo, o cinerottio, più o meno abbondante secondo l'età del lichene, e l'esposizione, in cui si trova; massime se già aver trascorso qualche spazio di tempo dacchè non sia stato dilavato dalle piogge; ha un legger odore di muffa secca; portato sulla lingua pare quasi insipido, ma ritenuto per qualche tempo in bocca, vi lascia finalmente un sapore leggermente stitico-amaro, il quale, se non è piacevole, non si può nemmeno dire ingrato.

Questo lichene, come abbiamo detto, nasce e vegeta su rocce di diversa natura, e variamente esposte; ma però s'incontra più frequentemente sulle granitiche, ed all'espansione di mezzogiorno, dove sembra che questa utile pianta trovi sia nella pietra, che le aere di matrice, sia nell'atmosfera che la circonda, circostanze più favorevoli alla sua propagazione, ed al suo nutrimento. Difatti, l'osservazione giornaliera dimostra che questo lichene (come altri per qualità botaniche e chimiche ad esso consimili) vi si trova più frequentemente, più

vegeta, e più robusta; e la sua riproduzione; ed il suo accrescimento si fanno con maggior prontezza, lochè non osservasi, quando si trova in circostanze diverse.

Questo lichene cresciuto, come gli altri di natura cosìmile, cresce molto lentamente; nel primordio del suo sviluppo però, gli contorni del principio generatore del colore dell'orricello, come del tornasole, ma la quantità n'è tenuissima; in questo stato il suo uso è, però, prezioso al fabbricatore di queste materie coloranti. Dietro l'osservazione fatta dai più sperimentati raccoglitori di questi licheni, sembra sia necessario lo spazio almeno di tre anni perchè arrivino a sufficiente maturità: ma si richiede il doppio di tempo per compiere il loro massimo grado di vegetazione. Egli è allora, che la raccolta ne riesce più lucrative per chi si dà a questo lavoro, e che l'impiego ne torna più vantaggioso al fabbricatore delle dette materie tintorie.

Importe ancora di notare, che talvolta sulla stessa roccia, su cui vegeta la varietate lichen, s'incontrano pure due altri licheni, cioè il geografico (1) ed il sulfureo (2), i quali, e

(1) *Lichen geographicus* L.; vedi *Lichen geographicus* Pers.

(2) *Lichen sulphureus* Hoffm. e in Persoon *colporeus* Ach.

principalmente il primo, non solo non sono proprii alla preparazione dell'orocchio, e del tornasole, ma non scappano inoltre la bontà, quando si trattano fenomeni alla variolaria latina, o ad altri licheni di simile natura. Ma però il colore giallo, o giallo-citrino, e l'odore dei suddetti è un carattere abbastanza sensibile e pronunziato per non confonderli col lichene variolaria, o con altri simili. I medicaglieri debbono pertanto aver l'atteggiamento nel raschiare questi dalla roccia, di evitare gli altri, vicinosi materie estranee inutili, ed anche noie al merito intrinseco dei licheni orocheligi, avvertendo bene, che la negligenza a la malizia loro a tale riguardo, venendo facilitata ricompensata dal compratore, dovrebber poi sempre a loro danno.

... I medicaglieri possono egualmente distinguere facilmente la variolaria latina, ed altri licheni connessi, proprii alla preparazione dell'orocchio e del tornasole, da quelli che non lo sono, per mezzo d'un esperimento semplice e facile. A tal fine s'introducano pochi grani di lichene polverizzato (megli' ovato, per esempio, poco più, o poco meno, non importa) in un ampollino di vetro bianco; vi si versa sopra dell'ammoniaca liquida concentrata del commercio quanto basti per formare una poltiglia

ben liquida; si agita ben bene per alcuni momenti, e s'abbandona al riposo, lasciando l'adipollino scoperto per qualche tempo; si agita di nuovo, e quindi si lascia sempre tranquillamente; se il lichene è proprio alla preparazione della predetta materia colorante, vi si svolge un colore giallo-carico, e talvolta giallo-bruno, il quale si fa sempre più carico sotto l'influenza dell'aria, e finalmente si fa rosso violaceo più o meno vivo, secondo la più o meno protratta reazione (1). Questa prova, essendo di quasi nessuna spesa, e di facilità di esecuzione, è alla portata di chiunque; epperò ogni può supplire al difetto di cognizioni botaniche delle persone che si danno alla raccolta dei licheni per farsi un'erba.

La raccolta di questa, come d'altri licheni cresciuti di natura vegetabile, si eseguisce con modi assai facili e semplici. Ampi si servono

(1) Il sig. Goué propone d'introdurre una piccola quantità di lichene polverizzato in un Macchiato, e di lasciarlo ben collucato qualche d'ore, aggiungendovi poco acqua di calce di fresco colata. Ed dice, che per questo modo, se il lichene è proprio alla fabbricazione dell'orizello, il miscuglio acquista un color bruno, nel caso opposto vi si svolge un color giallo, o rosso. Ma questa sperimentata prova mi pare; per il risultato ottenuto in varie prove nel poco tempo scorso, ed anche con prove di quelle sopra descritte.

d' una lamina di ferro dolce , affilata , e ricurva ad un' estremità , e ben fermata dall' altra ad un convessetto mobile di legno per mezzo di ripetuti giri di funicella. Quando l' estremità ricurva di questa lamina si trova convessata , ed altrimenti guasta dall' uso che se n' è fatto , se, o si spara un' altra uguale alla prima. La lamina , in tali estremità ricurve già trovate convessate o guaste , si riunisce , degli stessi raccoglitori , ricurpandole , ed assottigliandole di nuovo nell' sito d' un intervallo , e d' un sottetto a mano , ossia piccola locustina , che si pianta su d' un pezzo di legno , o sulla ceppa di un albero , come vogliono fare i falegnami per assottigliare le filee . Altri fanno uso d' un semplice cristallo di ferro duro (*crasset* in lingua volgare) , invece d' adattare lamina di legno , dettante a quello , di cui si servono gl' imbucatori per spianare la robbia macchia oscura , che ha servito ad imbucare la segaglia .

Il lichio nascosto dalla robbia si fa cadere in una taschetta di tela fitta ; e forse , la cui apertura è munita da un lato d' una lamina di ferro leggermente ricurva , che s' adatta più , o men esattamente alle roccie ; alle due estremità di questa lamina si adatta un squarcio di legno , per mezzo del quale si man-

viene aperta la taschetta, quando vi si fa cadere il lichene, che si va rinchiodando dalle rocce. Questo lavoro è così facile, che le donne, ed i ragazzi con pochi giorni di pratico esercizio si fanno capaci d'acquistar con sufficiente guadagno; quando questa sostanza non avevasi che un uso medico, da qual cosa deve per necessità scendere, o sia che se ne potesse la libera esportazione, e sia che se ne potesse il consumo nel nostro paese per la fabbricazione dell'orologio, e del cerchiale, che era la nostra industria tutta dell'estero, e che era.

Il tempo, il più conveniente per la raccolta di questi licheni presso di noi, si è poco dopo l'equinozio la notte, e poco dopo le piogge. Allora si stacca più facilmente dalla pietra, e la perdita si diminuisce.

La raccolta dei licheni debbe farsi con tutti i possibili riguardi per non esportare, almeno per quanto è possibile, di materia terrosa della roccia su cui si trovano; e se per la fragilità della pietra, e cui sono attaccati, se ne macchinano finissimi tavoli, o del lichene, si debbe aver cura di separarli da questo, e regalarli.

Qualunque lichene cresciuto sopra altro vegetale, e che sia stato tolto, quando sono verdi, ed so-

cucinati in acqua bollente, così si sono pure soggetti; nel qual caso si distrugge parzialmente il principio cicelligeno nei medesimi contenuta. Laonde, per anticipare questa inconvenienza, è necessario d'esporli al sole, ed all'aria; tutto portati a casa, per farli ben seccare; e, trattandosi di farne considerabile provvigione, fa d'uopo convertirli in grandi borse aerate le stecchi, rivolgendoli di tanto in tanto, massime nelle raccolte di primavera.

Non di rado si trovano sulle roccie accanto ai licheni, e involti in questi medesimi dei muschi erbacei, i quali sono di natura ben diversa, la cui presenza nei licheni, con cui si debbe preparare l'orizello, nuoce grandemente alla bontà di questo asteria colorante. Epperò i raccoglitori debbono, per quanto è possibile, avere l'avvertenza di scuocerli, e di separarli dal lichene, nell'atto stesso che lo raccolgono, e mandarlo poi nuovamente dei medesimi, quando sia trasportato nel grama. A tal fine si stende ugualmente il lichene sul pavimento, indi si fa lambire la sua superficie da un panno-lino di lungo pelo; per questo modo i muschi, facendosi aderenti al pelo sporgente del panno, ne vengono esportati; si rivolge di nuovo il lichene, agguagliandone la superficie, e si ripete la stessa operazione col

può essere netto dai macchi, con che si riesce a separarli quasi interamente.

Le norme, e le cautele proposte per la raccolta della varicolaria lutea, e degli altri licheni crocacei di simile natura, sono generalmente applicabili a quella dei fogliacci, proprii alla fabbricazione dell'orsello, e del tornasole, ed il facile sperimento chimico sopra descritto per constatare le quelle questa singolare proprietà porge pure un mezzo sicuro per riconoscerla nei fogliacci, e supplisce perciò alle cognizioni botaniche, di cui sono affatto privi coloro, che si danno a questo mestiere per guadagnarsi il pane.

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million, from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1995 (Department of Health 1996).

There is a growing emphasis on the need to improve the efficiency of the public sector, and to ensure that the public sector is able to deliver the services that are required by the public. This has led to a number of initiatives, including the introduction of competition, the restructuring of public sector organisations, and the introduction of new management practices. The aim of these initiatives is to improve the efficiency of the public sector, and to ensure that the public sector is able to deliver the services that are required by the public.

One of the key initiatives in the public sector is the introduction of competition. This has led to a number of public sector organisations being privatised, and to a number of public sector organisations being required to compete with private sector organisations. This has led to a number of public sector organisations being required to improve their efficiency, and to ensure that they are able to deliver the services that are required by the public.

Another key initiative in the public sector is the restructuring of public sector organisations. This has led to a number of public sector organisations being merged, and to a number of public sector organisations being required to restructure their operations. This has led to a number of public sector organisations being required to improve their efficiency, and to ensure that they are able to deliver the services that are required by the public.

A third key initiative in the public sector is the introduction of new management practices. This has led to a number of public sector organisations being required to adopt new management practices, and to a number of public sector organisations being required to improve their efficiency. This has led to a number of public sector organisations being required to ensure that they are able to deliver the services that are required by the public.

These initiatives have led to a number of public sector organisations being required to improve their efficiency, and to ensure that they are able to deliver the services that are required by the public. This has led to a number of public sector organisations being required to ensure that they are able to deliver the services that are required by the public.

These initiatives have led to a number of public sector organisations being required to improve their efficiency, and to ensure that they are able to deliver the services that are required by the public. This has led to a number of public sector organisations being required to ensure that they are able to deliver the services that are required by the public.

These initiatives have led to a number of public sector organisations being required to improve their efficiency, and to ensure that they are able to deliver the services that are required by the public. This has led to a number of public sector organisations being required to ensure that they are able to deliver the services that are required by the public.

These initiatives have led to a number of public sector organisations being required to improve their efficiency, and to ensure that they are able to deliver the services that are required by the public. This has led to a number of public sector organisations being required to ensure that they are able to deliver the services that are required by the public.